

Esercizi tutorato Fondamenti di Algebra Lineare e Geometria - XIII incontro

Ex 1. (3 appello 6/6/18) Si consideri il sottospazio $U = \langle [1 \ -1 \ 0 \ 1]^T, [-1 \ 0 \ 1 \ 1]^T \rangle$ di \mathbb{R}^4 .

- (a) Determinare una base di U e delle equazioni che lo definiscano.
- (b) Sia $W = U^\perp$ il sottospazio ortogonale di U , determinare una base ortonormale di W .
- (c) Detta $\pi_W : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la proiezione ortogonale su W , determinare $\pi_W([2 \ 0 \ 1 \ 1]^T)$.
- (d) Detto $V = \langle [2 \ 0 \ 1 \ 1]^T \rangle$, determinare la controimmagine $\pi_W^{-1}(V)$ del sottospazio V tramite la proiezione ortogonale π_W .

Ex 2. (3 appello 21/9/15) Detto k un parametro reale, si considerino le matrici:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & k+1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determinare i valori di k per i quali il vettore $v = [-1 \ 3 \ -1]^T$ è autovettore della matrice A_k . Esiste un k_0 tale che v sia autovettore di A_{k_0} relativo all'autovalore 3?
- (b) Al variare di $k \in \mathbb{R}$, determinare autovalori ed autospazi di A_k . Per quali valori di k la matrice A_k è diagonalizzabile?
- (c) Determinare un $k_1 \in \mathbb{R}$ tale che A_{k_1} sia simile alla matrice B . Tale k_1 è unico?
- (d) Determinare una matrice invertibile H tale che si abbia $B = H^{-1}A_{k_1}H$.

Ex 3. (2 appello 16/9/14) Si consideri l'endomorfismo $\phi_h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dipendente dal parametro $h \in \mathbb{R}$ definito da:

$$\begin{aligned} \phi_h([1 \ -1 \ 0 \ 0]^T) &= [1 \ 2 \ -1]^T, & \phi_h([0 \ 1 \ -1 \ 0]^T) &= [-1 \ h \ -1]^T, \\ \phi_h([0 \ 0 \ 1 \ 0]^T) &= [h \ 2 \ h-2]^T, & \phi_h([0 \ 0 \ 0 \ 1]^T) &= [0 \ h+2 \ -2]^T. \end{aligned}$$

- (a) Determinare $\phi_h([1 \ 0 \ -1 \ -1]^T)$.
- (b) Per $h = 1$, determinare una base di $\ker(\phi_1)$ e una base di $\text{Im}(\phi_1)$.
- (c) Determinare tutti gli $h \in \mathbb{R}$ tali che ϕ_h non sia suriettivo.
- (d) Per ogni $h \in \mathbb{R}$, determinare la controimmagine $\phi_h^{-1}([1 \ -1 \ 1]^T)$.

Ex 4. (6 appello 6/6/18) Nello spazio euclideo \mathbb{A}^3 si considerino le rette:

$$\left\{ \begin{array}{l} y - z = 0 \\ x + y + z = 1 \end{array} \right. \quad , \quad s : \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \left\langle \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix} \right\rangle.$$

- (a) Trovare una forma parametrica di r e una cartesiana di s , la loro posizione reciproca e distanza.
- (b) Determinare un piano π contenente s e tale che $\text{dist}(r, \pi) = \text{dist}(r, s)$.

Ex 5. (1 appello 10/7/19) Determinare tutti i numeri $z \in \mathbb{C}$ tali che si abbia:

$$2\frac{z}{1-i} + (1-2i)\bar{z} = 8+9i.$$